

КАРТКА-ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТА

Прадакса®
Дабігатрану етексилат

- ТРИМАЙТЕ ЦЮ КАРТКУ ВЕСЬ ЧАС З СОБОЮ
- Для перевірки версії Картки-пам'ятки зайдіть на сайт компанії
<http://www.boehringer-ingelheim.ua>
- Необхідно зберігати лише останню версію Картки-пам'ятки



23.01.2020

Шановний Пацієнте,

Ваш лікар призначив Вам препарат Прадакса® (дабігатрану етексилат). Для того, щоб застосування препарату Прадакса® було безпечним для Вас, будь ласка, зверніть увагу на важливу інформацію в Картці-пам'ятці.

Оскільки Картка-пам'ятка містить важливу інформацію, будь ласка, **тримайте Картку при собі весь час** для того, щоб інформувати працівників охорони здоров'я про застосування препарату Прадакса®.



Прадакса®: інформація для пацієнта

Щодо призначеного Вам лікування:

- Препарат Прадакса® розріджує кров, чим запобігає утворенню небезпечних тромбів.
- Виконуйте вказівки лікаря під час застосування препарату Прадакса®. Ніколи не пропускайте прийом чергової дози та не припиняйте застосування препарату Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який призначив препарат Прадакса®.
- Проінформуйте Вашого лікаря, який призначив препарат Прадакса®, про всі лікарські засоби, які Ви приймаєте в даний час.
- Повідомте попередньо Вашого лікаря про те, що Ви застосовуєте препарат Прадакса®, якщо Вам необхідне хірургічне/оперативне втручання.
- Препарат Прадакса® можна застосовувати незалежно від вживання їжі. Капсулу слід ковтати цілою, запиваючи склянкою води для полегшення потрапляння в шлунок. Не слід розламувати, жувати чи висипати гранули з капсули.

Коли потрібно звернутись до лікаря

- Прийом Прадакса® може збільшувати ризик виникнення кровотечі. Негайно зверніться до Вашого лікаря, який призначив препарат Прадакса®, у разі появи ознак та симптомів кровотечі, а саме наступних: набряк, дискомфорт, незвичний біль або головний біль, запаморочення, блідість, слабкість, незвичні синці, носові кровотечі, кровотечі ясен, незвичні довгі кровотечі після порізу, ненормальні менструальні виділення чи вагінальна кровотеча, кров у сечі, яка може бути рожевого або коричневого забарвлення, червоний / чорний стул, кашель з кров'ю, блювання кров'ю чи «кавовою гущею».
- Якщо під час лікування препаратом Прадакса® Ви впали чи поранили себе, особливо якщо Ви травмували голову, будь ласка, НЕГАЙНО зверніться за невідкладною медичною допомогою.
- Не припиняйте застосування препарату Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який призначив препарат Прадакса®, якщо у вас печія, нудота, блювання, дискомфорт у шлунку, здуття живота або біль у верхній частині живота.

Прадакса®: інформація для працівників охорони здоров'я

- Прадакса® – пероральний антикоагулянт (прямий інгібітор тромбіну).
- У разі потреби хірургічного чи оперативного втручання необхідно завчасно припинити застосування препарату Прадакса®.
- У разі значної кровотечі негайно припиніть лікування препаратом Прадакса®.
- Специфічний препарат зворотної дії (Праксбайнд®) доступний для призначення (для більш детальної інформації див. інструкції для медичного застосування лікарських засобів Прадакса® та Праксбайнд®).
- Прадакса® головним чином виводиться нирками; необхідно підтримувати відповідний діурез. Препарат Прадакса® піддається діалізу.

Ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Прадакса® за посиланням

<http://www.drlz.com.ua/>

Повідомлення про випадки побічних реакцій

Для звітування про побічні реакції та з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатись за телефоном: **+380 44 494 12 75**, факсом **+380 44 494 12 71**, або електронною поштою **PV_local_Ukraine@boehringer-ingenelheim.com**; або через сайт компанії <http://www.boehringer-ingenelheim.ua>. Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: **MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingenelheim.com**.

Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України за телефоном: **+380 44 202 17 00** або за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>

Будь ласка, заповніть цей розділ або зверніться до лікаря з цим проханням.

Інформація про пацієнта

Прізвище та ім'я пацієнта

Дата народження

Показання для призначення антикоагулянту

Доза препарату Прадакса®